

日期: 18 Feb 2011 10:18:58 +0800 

[完全表頭](#)

寄件者: [學務處衛保組公務信箱](#)

[<EMCARE@mail.tut.edu.tw>](mailto:EMCARE@mail.tut.edu.tw)   

收件者: "全體教職員工(專、兼任)" <EMCARE@mail.tut.edu.tw>

主旨: 教育部來函，近期校園傳染病防治宣導

[此通告為台南應用科技大學學務處公務信箱寄發](#)

寄件單位: 學務處 寄件者: 衛保組公務信箱

主旨: 教育部來函，近期校園傳染病防治宣導

內文:

1.根據衛生署疾病管制局監測資料顯示，2月9日公布今年首例麻疹確定病例，為就讀北部某校的28歲瑞士籍學生，該局已掌握接觸者進行健康監視中。麻疹係經由空氣、飛沫傳播或直接接觸病人的鼻腔或咽喉分泌物而感染，預防麻疹最佳方法為接種疫苗，現行預防接種政策為出生後12個月及國小1年級各接種1劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR疫苗)，不曾得過麻疹或未接種麻疹疫苗的學幼童，應儘速前往衛生所或合約醫院由醫師評估後接種；未完成接種者，家長應暫時避免前往流行高風險地區，以維護個人健康安全。如師生有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、發燒3~4天後口腔內側黏膜出現柯氏斑點、出疹等疑似麻疹症狀時，應儘速就醫。自流行地區返國就醫時，亦應主動向醫師告知旅遊史，以利診斷並及時防治。

2.流感疫情自99年11月下旬已有多起病例，根據國內門診與急診之類流感就診病例比率有明顯增加趨勢。流感會引起的症狀包括急性發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛，發燒的情況可能持續2至3天，患有心、肺、腎臟及代謝性疾病、貧血或免疫功能不全者，感染後出現細菌性及病毒性肺炎等嚴重併發症及死亡的機會很高。師生如出現流感症狀，應儘速採取個人防護措施並視需要就醫。

3.為防範麻疹及流感疫情，除鼓勵接種疫苗外，請培養良好的呼吸道衛生及咳嗽禮節，包括發燒或咳嗽等呼吸道症狀時配戴口罩，口罩沾到口鼻分泌物時，立即更換並丟進垃圾桶；打噴嚏用衛生紙或手帕遮住口鼻，若無衛生紙或手帕時，可用衣袖代替，衛生紙使用後應丟棄至垃圾桶；手部接觸到呼吸道分泌物時，應澈底清潔雙手等。

4.相關防治措施可參閱衛生署疾病管制局網頁 <http://www.cdc.gov.tw>，或撥免付費專線1922洽詢。

衛生保健組 關心您
