

台南科技大學 H1N1 新型流感疫苗接種 注意事項

1. 接種 H1N1 新型流感疫苗之重要性：學生接種 H1N1 新型流感疫苗，不但能有效減少學生感染新型流感的機率，降低醫療費用的支出，且亦能降低病毒的擴散，進而間接保護其他高危險族群，減少因感染而發生嚴重併發症的機率。
2. H1N1 新型流感疫苗-不宜接種對象：
 - (1) 已知對「蛋」之蛋白質或疫苗其他成分過敏者，不予接種。
 - (2) 過去注射流感疫苗曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。
 - (3) 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。
 - (4) 發燒或急性疾病宜延後接種。
 - (5) 特殊疾病或情況，須由醫生診斷是否適合接種。
3. 請各班級導師協助於 11/30 前將『H1N1 新型流感疫苗接種調查表』及『H1N1 新型流感疫苗接種同意書』繳回衛保組。
4. 本校七技五專一至三年級學生預定於 98 年 12 月 17 日 8:00~12:00 集中於乃建堂接種，請務必排除困難，配合衛生單位疫苗接種相關事宜，並依指定的時間前往施打。
5. 請導師於接種前協助分發同意書予學生帶回家長簽名及回收工作，並統計該班接種人數；接種時，協助維持學生秩序；接種後，觀察學生 30 分鐘，回到教室仍應注意或詢問學生有無不良反應。
6. 依規定接種當日該班導師須在場，協助確認學生身分，有影響課程之導師及任課教師准予停課。
7. 如時間有拖延，則依當日狀況而論，造成不便，請導師協助通知有課程之班級。
8. 請導師務必確認疫苗接種 6 步驟如下：
 - 步驟 1：確認家長同意書。
 - 步驟 2：確認學生身分。
 - 步驟 3：醫師評估是否適合接種疫苗。
 - 步驟 4：接種疫苗。
 - 步驟 5：接種後觀察 30 分鐘。
 - 步驟 6：回家後留意身體變化。
9. H1N1 新型流感疫苗接種後注意事項：
 - (1) H1N1 新型流感疫苗是一種不活化疫苗，接種後可能發生注射部位疼痛、紅腫，少數人會有發燒、頭痛、噁心等輕微反應，但一般均於接種後一到二天內恢復，的副作用則極少發生。
 - (2) 完成疫苗接種後，雖可降低感染 H1N1 新型流感的機率，但仍有可能罹患其他病毒所引起的流感及感冒，請注重個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。
 - (3) 接種 H1N1 新型流感疫苗後 48 小時內可能有發燒反應，應告知醫師曾經接種過 H1N1 新型流感疫苗，以作為鑑別診斷參考。接種 48 小時後仍然持續發燒時，應考慮可能另有其他感染或發燒原因。
 - (4) 通知家長留意子女接種疫苗後身體變化，如有發燒(持續超過 48 小時)、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、昏眩及心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，如有疑問，可電疫苗接種緊急諮詢專線 1922。
10. H1N1 新型流感疫苗接種緊急諮詢專線：1922。有關 H1N1 新型流感疫苗接種訊息，可參考 H1N1 新型流感專區網頁(<http://www.h1n1.gov.tw>)。學生接種作業請參考該網頁「H1N1 新型流感疫苗接種」項下資料。