

※預防施打疫苗時暈針注意事項：

1. 施打前勿空腹。
2. 施打時採坐姿。
3. 轉移注意力及放輕鬆。
4. 施打疫苗後小叮嚀(2 多 2 要)：
 - a. 多休息：接種疫苗後，在現場至少休息 30 分鐘，沒有不良反應或不舒服再離開。
 - b. 多喝水：接種疫苗後，請多喝開水。
 - c. 要警覺：如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、昏眩、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並告知醫師曾經接種過 H1N1 新型流感疫苗，以作為鑑別診斷之參考。
 - d 要注意：接種疫苗後，如有特殊反應時，請打電話通報當地衛生局或疾病管制局。
H1N1 新型流感疫苗接種緊急諮詢專線：1922。

※預防施打疫苗時暈針注意事項：

1. 施打前勿空腹。
2. 施打時採坐姿。
3. 轉移注意力及放輕鬆。
4. 施打疫苗後小叮嚀(2 多 2 要)：
 - a. 多休息：接種疫苗後，在現場至少休息 30 分鐘，沒有不良反應或不舒服再離開。
 - b. 多喝水：接種疫苗後，請多喝開水。
 - c. 要警覺：如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、昏眩、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並告知醫師曾經接種過 H1N1 新型流感疫苗，以作為鑑別診斷之參考。
 - d 要注意：接種疫苗後，如有特殊反應時，請打電話通報當地衛生局或疾病管制局。
H1N1 新型流感疫苗接種緊急諮詢專線：1922。